



NAVODILA ZA IZVAJALCE SOCIALNOVARSTVENE STORITVE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA – DOMOVI ZA STAREJŠE IN POSEBNI ZAVODI ZA ODRASLE

Stalni ukrepi



Ukrepi ob pojavu okužbe s SARS-CoV-2 pri izvajalcu institucionalnega varstva



Spremljanje zdravstvenega stanja in epidemiološke situacije stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev

Zaposlene je potrebno stalno opozarjati na spremljanje zdravstvenega stanja in hitro prepoznavanje suma na okužbo.

V primeru kakršnihkoli znakov akutne okužbe dihal ali drugih znakov in suma na okužbo ali glede na epidemiološko situacijo v družini, se mora zaposleni takoj izolirati in o tem obvestiti odgovorno osebo v ustanovi.

Bolezen COVID-19 lahko poteka tudi z blagimi, neznačilnimi prehladnimi znaki (zamašen nos, prebavne težave, nenadne izgube vonja, okusa glavobol, bolečine v žrelu, občutek težkih nog, utrujenost, motnje okusa), ali z bolj izrazitimi znaki kot so vročina, kašelj in težko dihanje.

[Ukrepi za preprečevanje vnosa virusa, 12.10.2020](#)

[Priporočila za preprečevanje in zaježitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialno varstvenih zavodih, 16.10.2020](#)

[Informacije za socialno-varstvene zavode v povezavi s SARS-CoV-2, 16.10.2020](#)

OBISKOVALCI

[Omejevanje oziroma prepoved obiskov, 12.10.2020](#)

[Obiski in izhodi stanovalcev, 7.9.2020](#)

[Informativno povpraševanje glede potreb po dodatnih jeklenkah kisika, 7.9.2020](#)

Izvajanje programov preprečevanja in obvladovanja okužb, vključno z okužbo SARS-CoV-2 (vključenost vseh služb v SVZ)

Dosledno izvajanje Kriznega načrta DSO.

[Vir: Odredba o začasni ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti glede na epidemiološki status, povezan z nalezljivo boleznijo COVID-19, 15.10.2020](#)

Upoštevanje Strokovnih podlag in smernic za obvladovanje in preprečevanje okužb, ki so povezane z zdravstvom oz. zdravstveno oskrbo:

[NAKOBO](#)

MZ je vzpostavilo telefonsko številko **080 71 10** na kateri lahko strokovni delavci in sodelavci SVZ od ponedeljka do petka med 9:00 in 11:00 uro ter med 15:00 in 16:00 uro prejmete strokovne nasvete in odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo pri delu, v povezavi s preprečevanjem in obvladovanjem okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Poudarek na kontinuiranem izobraževanju in usposabljanju vseh deležnikov (zaposleni, stanovalci, svojci, itd.)

Ključno je redno kontinuirano izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Priporočeno je, da sta za organizacijo internih izobraževanj in usposabljanj zadolženi dve osebi v DSO. Priporočeno je tudi, da DSO izvede simulacijo postopka, kako ravnati v primeru okužbe v DSO. Kot npr. požarna vaja.

Primeri vsebin internih izobraževanj:

- pravilno nameščanje in odstranjevanje kirurške maske, pravilna uporaba FFP2 in FFP3 respiratorjev
- higiena rok (pravilno umivanje rok, pravilno razkuževanje rok)
- pravilna higiena kašljanja in kihanja
- kaj je COVID-19 in ustrezni ukrepi v DSO
- ukrepi v ustanovi v primeru suma na okužbo pri stanovalcu
- ukrepi ob pojavu okužbe pri zaposlenih
- čiste in nečiste poti v DSO
- pravilno čiščenje in razkuževanje prostorov, predmetov
- pravilno pranje in vzdrževanje perila, tudi v primeru suma na okužbo
- pravilna uporaba posode pri stanovalcih s sumom na okužbo ter okuženimi s COVID-19

[Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialno varstvenih zavodih, 16.10.2020](#)

Več:

Posnetki pravilnega nameščanja in odstranjevanja mask, umivanje in razkuževanje rok, oblačenje in slačenje OVO:

<https://www.zbornica-zveza.si/clanek/prikaz-namescanja-in-odstranjevanja-mask-umivanje-razkuzevanje-rok-ter-oblacenje-in-slacenje-osebne-varovalne-opreme/>

Priporočila za ravnanje s tekstilijami in razdeljevanjem hrane

<https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2020/04/Priporo%C4%8Dila-za-ravnanje-s-tekstilijami-in-razdeljevanjem-hrane-z-za-izvajalce-socialnovarstvenih-ustanov.pdf>

Poročanje o kadrih in stanju zalog osebne varovalne opreme

Priporočeno je, da je v DSO zadolžena ena oseba za pregled in poročanje o kadrih in stanju zalog osebne varovalne opreme.

Regijski sezname zaposlenih

Pripravijo se REGIJSKI SEZNAMI ZAPOSLENIH, ki se aktivirajo v trenutku, ko pride v posameznem zavodu do okužbe.

Dodatni kader se aktivira v roku 2-3 dni po potrebi in po solidarnostnem ključu.

V posamezen regijski seznam so vključeni zaposleni iz regijskih domov starejših

Za potrebe podpore socialno-varstvenim zavodom na ustrezno ukrepanje za preprečevanje in zajezitev oziroma obvladovanje respiratornih nalezljivih bolezni v socialno-varstvenih zavodih, se v ministrstvu, pristojnem za zdravje, vzpostavi stalna delovna skupina koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi pri izvajalcih v mreži javne službe na področju socialnega varstva.

[Delovna skupina koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialno varstvenih in vzgojno-izobraževalnih zavodih in pri koncesionarijih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni mreži](#)

Sum na okužbo pri stanovalcu

Postopanje v skladu s kriznim načrtom zavoda.

Organiziranje sive cone:

Siva cona se organizira na način individualne namestitve osebe v prostorih, ločenih od prostorov za obravnavo asimptomatskih pacientov z negativno epidemiološko anamnezo in ločeno od pacientov, pri katerih je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2. Zmogljivost sive cone se prilagaja glede na obseg števila oseb, ki prihajajo k posameznim izvajalcem zdravstvene dejavnosti.

[Vir: Odredba o začasni ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti glede na epidemiološki status, povezan z nalezljivo boleznijo COVID-19](#)

[Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialno varstvenih zavodih, 16.10.2020](#)

Pri stanovalcih DSO/SVZ je pomembno hitro prepoznavanje in obravnavo obolelih. Spremljajte bolezenske znake okužbe dihal: vročina, kašelj, sprememba kašlja, oteženo dihanje ali druge nespecifične spremembe zdravstvenega stanja. Bodite pozorni na pojav vročine, izvajajte dnevno merjenje temperature pri vseh. Tudi pri novo sprejetih ali premeščenih uporabnikih bodite pozorni na te bolezenske znake. Uporabnike, ki to zmorejo, prosite, da ob pojavu vročine, kašlja, težkega dihanja ali drugih bolezenskih znakov, takoj obvestijo osebje in uporabljajo kirurško masko. Če se pojavi povišana telesna temperatura ali simptomi okužbe dihal, takoj začnite z izvajanjem ustaljenih postopkov za obvladovanje in preprečevanje okužb. O dogodku takoj obvestite odgovornega (domskega) zdravnika in območno epidemiološko službo. Zdravnik oceni zdravstveno stanje obolelega in ukrepa po algoritmu.

[Vir: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Obravnava-in-testiranje-zaposlenih-in-stanovalcev-na-okuzbo-s-SARS-CoV-2-v-DSO-13. 9. 2020.pdf](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Obravnava-in-testiranje-zaposlenih-in-stanovalcev-na-okuzbo-s-SARS-CoV-2-v-DSO-13. 9. 2020.pdf)

Premestitev stanovalca s sumom na okužbo z virusom v sivo cono

Postopanje v skladu s kriznim načrtom zavoda.

[Odredba o začasni ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti glede na epidemiološki status, povezan z nalezljivo boleznijo COVID-19](#)

Uporaba ustrezne OVO v sivi coni:

[Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialno varstvenih zavodih, 16.10.2020](#)

Odvzem brisa

Bris odvzame izvajalec zdravstvene dejavnosti.

[Navodilo glede odvzema brisa in izvedba laboratorijske analize na SARS-CoV-2 pri oskrbovancih socialno varstvenih zavodov in zaposlenih zdravstvenih delavcih in sodelavcih, št. 181-70/2020/782, Obravnava in testiranje zaposlenih in stanovalcev na okužbo s SARS-CoV-2 v DSO/SVZ](#)

Negativen bris

TESTIRANJE STANOVALCEV S SIMPTOMI (npr. vročina, kašelj): V primeru negativnega rezultata, stanovalca premestimo v enoposteljno sobo v sivo cono, kjer ostane do ozdravitve. Ko je asimptomatski opravimo še en test in če je ta negativen, se stanovalca lahko premesti nazaj v njegovo sobo ali v stanovanjsko skupnost.

Asimptomatske stanovalce DSO/SVZ se testira, če so bili v tesnem stiku s potrjenim primerom COVID-19 (npr. bivanje v isti sobi, stanovanjske skupnosti). Testiranje se opravi takoj po tveganem stiku. Stanovalec v primeru negativnega rezultata ostane izoliran v sobi. 7 dni se ga pozorno spremlja in nato ponovno testira:

- Če je test po preteku 7 dni negativen, se stanovalec vrne v svojo sobo ali stanovanjsko skupnost in se ga pojmuje kot negativnega.
- Če je rezultat testa po 7 dneh pozitiven, stanovalca premestimo v izolacijo ali kohortno izolacijo (rdeča cona) in ukrepamo kot pri pozitivnem stanovalcu.
- Če se v vmesnem času pojavijo znaki/simptomi akutne okužbe dihal, stanovalca obravnavamo po postopku za stanovalce z znaki/simptomi akutne okužbe dihal.

V primeru, da v sivi coni ni več prostora, stanovalca lahko izoliramo v sobi, s čimer soba postane siva cona.

[Obravnava in testiranje zaposlenih in stanovalcev na okužbo s SARS-CoV-2 v DSO/SVZ](#)

Pozitiven bris

Ob prejemu pozitivnega brisa se stanovalca preseli v rdečo cono in se obvesti epidemiološko službo, ki usmerja in vodi nadaljne postopke.

V primeru pozitivnega rezultata na SARS-CoV-2 pri stanovalcu z znaki/simptomi akutne okužbe dihal/vročine se odredi takojšna izolacija ali kohortna izolacija (rdeča cona). Ponovno testiranje stanovalcev v DSO/SVZ, dokler so v izolaciji ali kohortni izolaciji, ni smiselno.

Stanovalca lahko iz izolacije premestimo nazaj v sobo ali v stanovanjsko skupnost 14 dni po umiritvi simptomov in znakov bolezni. Ponovno testiranje ni potrebno.

V primeru pojava okužbe pri zaposlenem ali pri stanovalcu se za čas razjasnitve epidemioloških razmer takoj uvede začasna prepoved obiskov in izhodov oskrbovancev ter prekine izvajanje morebitnih nenujnih zunanjih aktivnosti. Prav tako se v teh primerih v SVZ ne sprejema novih oskrbovancev. Začasna prepoved obiskov oziroma izhodov lahko traja samo za čas razjasnitve epidemioloških razmer. Vračanje oskrbovancev iz bolnišnice ali od drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti poteka nemoteno, ob spremljanju epidemioloških razmer oskrbovanca, ki se v SVZ vrača.

[Vir: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Obravnava-in-testiranje-zaposlenih-in-stanovalcev-na-okuzbo-s-SARS-CoV-2-v-DSO-13. 9. 2020.pdf](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Obravnava-in-testiranje-zaposlenih-in-stanovalcev-na-okuzbo-s-SARS-CoV-2-v-DSO-13. 9. 2020.pdf)

Aktivacija delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-COV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialno varstvenih in vzgojno izobraževalnih zavodih in pri koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni mreži

Naloge delovne skupine, ki se v dogovoru z ministrstvom izvajajo na podlagi zaprosila posameznega SVZ so:

- sodelovanje z odgovornimi osebami v SVZ in odgovornimi nosilci za področje zdravstvene nege v SVZ in drugimi deležniki pri načrtovanju preprečevanja in obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v SVZ ter vzpostavitvi con glede na epidemiološke razmere v SVZ,
- izvedba svetovalnega obiska SVZ v povezavi z izvedbo ukrepov za preprečevanje prenosa SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v SVZ,
- pregled in ocena ustreznosti kriznih načrtov SVZ za učinkovito ukrepanje v primeru pojava okužbe s SARS-CoV-2 v SVZ,
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi programov usposabljanj zdravstvenih delavcev, zdravstvenih sodelavcev, prostovoljcev v SVZ ali drugih deležnikov v povezavi s pravilno uporabo osebne varovalne opreme in ukrepov, namenjenih preprečevanju prenosa SARS-CoV-2 in drugih nalezljivih respiratornih bolezni v SVZ,
- sodelovanje pri načrtovanju podpornih ukrepov za SVZ in zdravstvene delavce ter zdravstvene sodelavce v okoljih, ki se srečujejo s pojavom okužbe s SARS-CoV-2,
- sodelovanje z Nacionalno komisijo za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, za področje SVZ pri pripravi smernic preprečevanja in obvladovanja okužb v SVZ,
- priprava mnenj in stališč v povezavi s potrebnimi ukrepi za preprečevanje in obvladovanje okužbe SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v SVZ.

Poleg navedenega regijski tim v okviru delovne skupine opravlja naslednje naloge:

- v primeru pojava okužbe z virusom SARS-CoV-2 v SVZ (pri oskrbovancu ali zaposlenem v SVZ, ki je bil v neposrednem stiku z oskrbovanci), se na zaprosilo SVZ, čim prej, najkasneje pa naslednji dan po potrjenem primeru okužbe v SVZ, s predstavniki SVZ sestanejo predstavniki regijskega tima, ki jih določi vodja regijskega tima. Predstavnikom regijskega tima se v dogovoru z vodjo delovne skupine oziroma njegovim namestnikom, pridružijo drugi člani delovne skupine,
 - po aktiviranju rdeče cone v SVZ se SOBO, sanitarni inženir oziroma higieničar vključi na način svetovanja v delovnem okolju; in sicer za čas 7 – 14 dni od vzpostavitve rdeče cone.
- Vodja regijskega tima razpolaga s kontakti članov regijskega tima, komunicira z ministrstvom in območno pristojnim epidemiologom.

[Delovna skupina koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialno varstvenih in vzgojno-izobraževalnih zavodih in pri koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni mreži](#)

[Kontakti epidemiološke službe](#)

Umik primarnih primerov stanovalcev z okužbo

Umik prvih stanovalcev z okužbo (pozitiven bris v zadnjih 24 urah) v bolnišnico v trajanju do največ 3 dni dokler to dopuščajo bolnišnične kapacitete.

Zavod v mora rdečo cono vzpostaviti v roku 24 ur do prve okužbe.

[Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialno varstvenih zavodih, 16.10.2020](#)

[Informacije-za-socialno-varstvene-zavode-v-povezavi-s-SARS-CoV-2, 16.10.2020](#)

Organizacija rdeče cone:

Rdeča cona se lahko organizira na način kohortne osamitve (namestitve, ki dopušča obravnavo pacientov, pri katerih je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, znotraj iste sobe oziroma prostora).

Prostori rdeče cone so fizično ločeni od prostorov za obravnavo asimptomatskih pacientov z negativno epidemiološko anamnezo in od sive cone. Zmogljivost rdeče cone se prilagaja glede na obseg števila pacientov, pri katerih je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2.

[Vir: Odredba o začasni ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti glede na epidemiološki status, povezan z nalezljivo boleznijo COVID-19](#)

Sum na okužbo pri zaposlenem

Zaposleni naj bodo ves čas pozorni na morebitne znake okužbe s SARS-CoV-2 in naj v primeru suma na okužbo oziroma tesnega kontakta z osebo, pri kateri je prisoten sum na okužbo s SARS-CoV-2 oziroma je okužba potrjena, ne prihajajo na delo in se o potrebnih nadaljnjih ukrepih posvetujejo z izbranim osebnim oziroma nadomestnim zdravnikom.

V primeru suma na okužbo s SARS-CoV-2 naj zaposleni ne vstopajo v delovni proces, ob pojavu simptomov, ki bi nakazovali na možnost okužbe s SARS-CoV-2, ko so zaposleni že na delovnem mestu, pa se jih takoj nadomesti z drugimi zaposlenimi in do razjasnitve stanja kužnosti oziroma ozdravitve odstrani iz delovnega procesa. V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 pri zaposlenih pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, kakor tudi potrjene okužbe pri stanoovalcih se izvajalec zdravstvene dejavnosti pri načrtovanju potrebnih ukrepov, poveže z območno pristojnim epidemiologom.

Brisi na SARS-CoV-2 pri zaposlenih pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti in pri oskrbovancih v SVZ

Oskrbovanci SVZ in zaposleni v zdravstvu ter socialnem varstvu, se ob sumu na okužbo s SARS-CoV-2, testirajo prednostno – upošteva se navodila glede opreme napotne dokumentacije z informacijo, skladno z navodilom ministrstva Izvajanje Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zaježitve in obvladovanje epidemije COVID19, št. 181-70/2020/152 z dne 25. 3. 2020 5 , kjer smo podali opozorilo, da tisti, ki odvzame bris na SARS-CoV-2, na napotni dokument za laboratorij, z rdečim pisalom napiše, da gre za bris oskrbovanca v SVZ ter naziv in poštni naslov SVZ. Enako velja tudi v primeru iemania brisa pri zdravstvenem delavcu oziroma sodelavcu. V kolikor bi na terenu prihajalo do odklonov. nas prosimo o tem obvestite.

[Priporočila za preprečevanje in zaježitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialno varstvenih zavodih, 16.10.2020](#)

[Navodilo glede odvzema brisa in izvedba laboratorijske analize na SARS-CoV-2 pri oskrbovancih socialno varstvenih zavodov in zaposlenih zdravstvenih delavcih in sodelavcih, št. 181-70/2020/782,](#)

Zaposlenega se do razjasnitve stanja takoj odstrani iz delovnega procesa

V primeru suma na okužbo s SARS-CoV-2 naj zaposleni ne vstopajo v delovni proces, ob pojavu simptomov, ki bi nakazovali na možnost okužbe s SARS-CoV-2, ko so zaposleni že na delovnem mestu, pa se jih takoj nadomesti z drugimi zaposlenimi in do razjasnitve stanja kužnosti oziroma ozdravitve odstrani iz delovnega procesa. V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 pri zaposlenih pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, kakor tudi potrjene okužbe pri oskrbovancih, se izvajalec zdravstvene dejavnosti pri načrtovanju potrebnih ukrepov, poveže z območno pristojnim epidemiologom.

Pri zaposlenem se prednostno vzame in izvede analiza brisa na okužbo z virusom SARS-CoV-2.

[Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialno varstvenih zavodih, 16.10.2020](#)

[Vir: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Obravnava-in-testiranje-zaposlenih-in-stanovalcev-na-okuzbo-s-SARS-CoV-2-v-DSO-13. 9. 2020.pdf](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Obravnava-in-testiranje-zaposlenih-in-stanovalcev-na-okuzbo-s-SARS-CoV-2-v-DSO-13. 9. 2020.pdf)

Pozitiven bris

V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 pri zaposlenih, se zavod pri načrtovanju potrebnih ukrepov poveže z območno pristojnim epidemiologom.

[Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialno varstvenih zavodih, 16.10.2020](#)

Negativen bris

Negativni zaposleni (izhodiščni test) z znaki akutne okužbe dihal in/ali vročino, ostane v bolniškem staležu (doma) do ozdravitve. Ko je brez simptomov, se lahko vrne v delovni proces.

[Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialno varstvenih zavodih, 16.10.2020](#)